

Инструкция родителям и пациенту перед предстоящим стоматологическим лечением под общей анестезией

Уважаемые родители,

для безопасности вашего ребенка следуйте представленным ниже инструкциям.

Необходимые анализы	<ol style="list-style-type: none">1. Общий анализ крови2. При хирургических вмешательствах дополнительно гемостазиологический комплекс (время свертывания крови, длительность кровотечения)3. Общий анализ мочи4. ЭКГ с расшифровкой5. Выписка из амбулаторной карты, если ребенок состоит на учете у каких-либо специалистов6. Результаты проведенных исследований ребенка (медицинские заключения, результаты анализов и пр.), выполненные в сторонней клинике, если такие исследования проводились7. При необходимости врач может назначить дополнительное обследование.
Прием воды и пищи	Во избежание рвоты и осложнений во время общей анестезии не нарушайте следующие рекомендации: <ol style="list-style-type: none">1. Не принимайте тяжелую пищу после полуночи перед лечением2. За 6 часов до лечения не принимать твердой пищи3. За 4 часа до лечения не принимать жидкость4. Возможен прием ограниченного количества (из расчета до 3мл на 1кг массы тела ребенка) прозрачной жидкости за 2 часа до начала анестезиологического пособия5. Ребенок должен находиться под наблюдением взрослых во избежание самостоятельного приема воды и пищи.
Одежда	Ребенок должен быть одет в удобную, свободную одежду, доступ к рукам, ногам и груди пациента не должен быть затруднен. Ребенку до 3х лет желательно одеть памперс, для ребенка более старшего возраста взять запасной комплект одежды.
Изменения в состоянии здоровья	Любые изменения в состоянии здоровья ребенка, в том числе простуда, лихорадка, за 7 дней до лечения имеют большое значение. Для безопасности ребенка нужно посетить врача. Проинформируйте нас о возникших изменениях в состоянии ребенка перед визитом.
Профилактические прививки	За 10-14 дней до лечения и 2-3 дня после лечения не рекомендуется проводить профилактических прививок. Если лечение вашего ребенка совпадает с графиком профилактических прививок, одно из лечебных мероприятий необходимо перенести.
Консультация анестезиолога	Консультация и осмотр анестезиолога обязательны. Первичная консультация может производиться по телефону, однако в день лечения предоперационный осмотр и консультация анестезиолога обязательны.
Прибытие в клинику	Законный представитель (мама, папа, опекун, попечитель и иные законные представители) должен сопровождать ребенка по пути в стоматологическую клинику и остаться там на время лечения. Планируйте прибыть заранее.
Прием лекарственных препаратов	График приема лекарственных препаратов, которые ваш ребенок принимает постоянно, в день лечения необходимо согласовать с врачом-анестезиологом и Вашим лечащим врачом. Не давайте ребенку никаких лекарственных средств до и после лечения без консультации с врачом.
Физическая активность	Не планируйте никакой физической деятельности для ребенка после лечения. Ребенок должен отдыхать. Пристально наблюдайте за ребенком в течение всего дня после лечения.
Транспортировка домой	Ребенка должен сопровождать взрослый. За ребенком нужно пристально наблюдать во время транспортировки.
Прием жидкости и пищи после проведенного лечения	В качестве питья после лечения рекомендована простая вода. Затем можно дать ребенку сладкие напитки (фруктовые соки). Затем можно давать мягкую негорячую пищу.
Повышение температуры тела	В первые сутки после лечения возможно повышение температуры тела. Дайте ребенку препараты на основе парацетамола или ибупрофена для ее снижения. В случае повышения температуры тела выше 38°, необходимо обратиться к врачу.
Обращение к врачу в случае	<ol style="list-style-type: none">1. Рвоты в течение 4-6 часов после окончания проведения анестезии2. Повышения температуры тела выше 38° и на срок более 24 часов после окончания проведения анестезии3. Затрудненном дыхании ребенка4. По другим вопросам, связанным с проведенным лечением.