

## Памятка для стоматологического лечения под общей анестезией

Уважаемый пациент!

Для Вашей безопасности следуйте представленным ниже инструкциям.

Необходимые анализы	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Общий анализ крови</li><li>2. При хирургических вмешательствах дополнительно геморрагический комплекс (время свертывания крови, длительность кровотечения, МНО, АЧТВ)</li><li>3. Общий анализ мочи</li><li>4. Сахар крови</li><li>5. ЭКГ с расшифровкой</li><li>6. Выписка из амбулаторной карты, если пациент состоит на учете у каких-либо специалистов</li><li>7. При необходимости врач может назначить дополнительное обследование.</li></ol>
Прием воды и пищи	Во избежание рвоты и осложнений во время общей анестезии не нарушайте следующие рекомендации: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Не принимайте тяжелую пищу после полуночи перед лечением</li><li>2. За 6 часов до лечения не принимать твердой пищи</li><li>3. За 4 часа до лечения не принимать жидкость</li><li>4. Возможен прием ограниченного количества (не более 200 мл взрослым) прозрачной жидкости (вода, сладкий чай) за 2 часа до начала анестезиологического пособия</li></ol>
Одежда	Перед лечением под наркозом пациент должен одеть удобную свободную одежду, доступ к рукам, ногам и груди пациента не должен быть затруднен. Лицам женского полу не рекомендуется при лечении с применением общей анестезии одевать платье, комбинезон и иную подобную одежду, не дающую возможность свободного доступа к грудной клетке пациента.
Изменения в состоянии здоровья	Любые изменения в состоянии здоровья (ОРВИ, повышение температуры и др.), за 7 дней до лечения имеют большое значение. Необходимо проинформировать лечащего врача о возникших изменениях в состоянии Вашего здоровья перед визитом.
Профилактические прививки Консультация анестезиолога	За 10-14 дней до лечения и 2-7 дней после лечения не рекомендуется проводить профилактических прививок. Консультация и осмотр анестезиолога обязательны. Первичная консультация может производиться по телефону, однако в день лечения предоперационный осмотр и консультация анестезиолога обязательны.
Прием лекарственных препаратов	График приема лекарственных препаратов, которые Вы принимаете постоянно, в день лечения необходимо согласовать с врачом-анестезиологом и Вашим лечащим врачом. Не допустимо применение лекарственных препаратов в день процедуры без согласования с врачом-анестезиологом.
Активность	Физическая активность и занятия экстремальными видами спорта после лечения допустимы после решения врача. Не рекомендуются все виды деятельности, требующие повышенного внимания и ответственности в течение 24 часов после окончания общего обезболивания: <ul style="list-style-type: none"><li>- управление транспортными средствами;</li><li>- работа с потенциально опасным оборудованием, которое может причинить вред здоровью;</li><li>- рекомендуем отказаться от любых юридически значимых действий и принятия важных решений.</li></ul>
Транспортировка домой	Во время возвращения домой необходимо присутствие сопровождающего для контроля Вашего состояния.
Прием жидкости и пищи после проведенного лечения	В качестве питья после лечения рекомендована простая вода. Следующий прием пищи и воды возможен не раньше, чем через 2 часа. Необходимо исключить горячую или холодную пищу в течение суток после проведения общей анестезии.
Повышение температуры тела	В первые сутки после лечения возможно повышение температуры тела. Допустимо применение лекарственных препаратов на основе парацетамола или ибупрофена для ее снижения. В случае повышения температуры тела выше 38° необходимо обратиться к врачу.
Обращение к врачу в случае	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Рвоты в течение 4 часов после проведения анестезии</li><li>2. Повышения температуры тела выше 38° или на срок более 24 часов после проведения анестезии</li><li>3. Затрудненного дыхания</li><li>4. По любым другим вопросам, связанным с проведенным лечением.</li></ol>